

ZIEKTEN EN PLAGEN IN SUIKERBIETEN

ZIEKTEN & PLAGEN HERKENNEN
= DOELGERICHT SPUITEN!

Cercospora



Herkenning: ronde grijze vlekjes (1 - 3 mm) met een donkere roodpaarse rand, onregelmatig over het blad verspreid. In de vlekjes zijn zwarte puntjes te zien (alleen met loep). Eerst worden de buitenste bladeren aangetast, later de binnenste bladeren.

Tijdstip: vanaf sluiting van het gewas.


Ramularia



Herkenning: grote en onregelmatige vlekken (3 - 8 mm) met een bruinachtige rand, vaak eerst op oudere bladeren. Bij een zware aantasting lopen de vlekken in elkaar over. In de vlekjes zijn witte puntjes te zien (alleen met loep).

Tijdstip: vanaf sluiting van het gewas.

Stemphylium



Herkenning: kleine, onregelmatige gele vlekjes verspreid over het hele blad. Het binnenste van de eerste vlekjes sterft na enige tijd af (necrose) tot een bruin weefsel. Zwaar aangetaste bladeren sterven af en op nieuw gevormd blad verschijnen nieuwe vlekjes.

Tijdstip: vanaf sluiting van het gewas.

Meeldauw



Herkenning: eerst kleine stervormige witte vlekken op het blad, later uitgroeïend tot een witte stofachtige poederlaag. In het schimmelpluis zijn zwarte puntjes zichtbaar. Het blad kleurt bleekgroen en kan verdrogen.

Tijdstip: met name juli en augustus.

Roest



Herkenning: kleine roedoranje tot roestkleurige vlekjes (0,5 - 1,5 mm) aan beide kanten van het blad. De vlekjes zien eruit als kleine puistjes. Soms kleurt het blad rondom de vlekjes geel. Bij een zware aantasting verdrogen de bladeren.

Tijdstip: vanaf sluiting van het gewas.

Pseudomonas



Herkenning: vrij scherp begrensde zwartbruine vlekken, omgeven door ontkleurd bladweefsel. Vlekken verspreiden zich over het hele blad. Er vallen gaten in de bladeren.

Tijdstip: hele seizoen door.

Phoma



Herkenning: grote, duidelijk afgetekende bruine vlekken (1 - 5 cm) met barsten erin. Om de vlekken zitten lichte en donkere ringen. De nerven van het blad kunnen bruin verkleuren.

Tijdstip: vanaf juni.

Zwarte bonenluis



Herkenning: gedrongen en gekruld blad ('kroezen') als gevolg van zuigschade. Aan de onderkant van het blad zitten zwarte luizen.

Tijdstip: vanaf juni.

Bietenflug



Herkenning: mineergangen door het blad (gemaakt door larven). Later drogen deze uit en worden delen van het blad bruin en dor.

Tijdstip: vanaf juli.

Bietenkever



Herkenning: kleine ronde gaatjes in de wortel of stengel, later ook in het blad. Planten vallen vaak weg in het kiembladstadium.

Tijdstip: rond opkomst.

Rupsen



Herkenning: onregelmatige vraatgaten in de bladeren (vaak tussen de nerven). Soms spinsel zichtbaar aan de onderkant van het blad.

Tijdstip: april t/m juni.